

Informations sur les parasites

Le vers du cœur :



Il se transmet d'un chien à l'autre par l'intermédiaire d'un moustique, du printemps à l'automne. Si elle n'est pas traitée, la maladie peut causer la mort de l'animal. Les symptômes incluent la fatigue, la perte de poids et la toux chronique. Il faut plus de 6 à 7 mois après l'infection pour que les symptômes deviennent apparents; la maladie est par contre déjà à un stade avancé.

Prévention: traitement préventif durant la saison des moustiques.

Détection: test exécuté au mois de mai-juin; détecte les antigènes des vers adultes femelles.

Les tiques :



Les tiques peuvent être porteuses de maladies et elles les transmettent en mordant les chiens.

Les symptômes, selon la maladie, peuvent être les suivants: boiterie, fièvre, enflure des articulations, insuffisance rénale, anorexie, manque d'énergie, perte d'appétit, vomissements, etc. Si la maladie est détectée et traitée rapidement, les chances de rétablissement total sont excellentes.

Prévention: traitement préventif selon la température (les tiques sont actives à partir de 4°C), éviter les herbes hautes/haies de cèdres, inspection quotidienne et retrait des tiques.

Détection de la maladie de Lyme: test exécuté 6 à 8 semaines après le retrait d'une tique (le test confirme si la tique qui a mordu l'animal a transmis une maladie)

On peut toutefois aussi faire analyser la tique retirée pour connaître son espèce ainsi que savoir si elle est porteuse d'une maladie. Par contre, cela ne nous indique pas si l'animal a été infecté.

Gale sarcoptique, mites d'oreille et Cheyletiella :

Parasites de peau non visibles à l'œil nu. Hautement contagieux par contact direct avec l'animal infesté.

Prévention: Traitement préventif.



Puces :

Les puces vivent sur l'animal et dans l'environnement. Elles sont très contagieuses d'un animal à un autre. Elles se nourrissent de leur sang.

Prévention: Traitement préventif durant les situations et les saisons à risques (T° en haut de 6°C ou environnement infesté.



Vers ronds, vers à crochets ou vers à fouet :

Parasites internes, rarement visibles dans les selles, transmis par contact direct (ex: ingestion d'un œuf en léchant un chien infesté) ou indirect (ex: ingestion d'un œuf sur les selles laissées par un autre chien).

Traitement variable dépendamment du vers détecté.

Prévention: Faire l'analyse des selles de l'animal chaque année.

Traitements préventifs

Parasites ciblés	HeartGard	Revolution	Avantage Multi	Bravecto	NexGard	K9 Advantix
Vers du cœur	X	X	x			
Vers ronds	X	X	X			
Vers à crochets	X		x			
Vers à fouet			x			
Vers pulmonaire			x			
Mites d'oreilles		X	X	X	X	
Cheyletiella (mites d'oreilles)		X	x			
Gale Sarcoptique		X	X	X	x	
Tiques				X (3 espèces)	X (3 espèces)	X (au contact) (5 espèces)
Puces		X (adultes seulement)	X (adultes seulement)	X (adultes seulement)	X (adultes seulement)	X (Œufs, Larves et adultes)
Moustiques						X
Administration	Par la bouche, une fois par mois	Sur la peau, en un site, une fois par mois	Sur la peau, en 3 sites, une fois par mois (selon le poids)	Par la bouche, avec un repas, une fois aux 3 mois	Par la bouche, avec un repas, une fois par mois	Sur la peau, en 3 sites, une fois par mois (selon le poids)
Contre-indications	Allergie au bœuf	Pas de bain ou baignade pour 2 heures	Pas de bain ou baignade pour 90 minutes	Chiot moins de 6 mois		Le chien ne doit pas toucher aux chats pendant 8 heures. Pas de bain ou baignade pour 72 heures.
				Saveurs artificielles		